

عناب

زیرگروه گیاهان دارویی و داروسازی طب سنتی گروه حکمت، طب اسلامی و طب سنتی، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

Ziziphus jujuba



چکیده

عَنَاب (عَنَاب) میوه درختچه‌ای است به ارتفاع تا حدود ۱۰ متر که شاخه‌های فراهم و خارهای بلند یا کوتاه و خمیده دارد. میوه عَنَاب کروی تا کمی کشیده و بیضوی، قرمز یا قهوه‌ای تیره با طعمی شیرین و یک دانه بیضی کشیده و نوک تیز است و در تابستان تا اوایل پاییز می‌رسد. در طب سنتی ایران به عنوان صاف‌کننده خون و نرم‌کننده سینه و رفع‌کننده التهاب و گرمی کاربرد دارد. مشخصات ذکر شده در منابع سنتی با مشخصات گونه *Ziziphus jujuba* Miller مطابقت دارد.

مقدمه:

گل‌های آن به رنگ سبز متمایل به زرد و فاقد کرک هستند و در اواسط بهار تا اواسط تابستان ظاهر می‌شوند. بهره‌گیری از مفردات موجود در منابع طب سنتی برای مقاصد درمانی، در قدم اول تعیین ماهیت و نام علمی دقیق آنها را می‌طلبد. لذا بر آن شدیم تا طی این تحقیق ماهیت عَنَاب موجود در منابع طب سنتی را بررسی کرده و آن را با خصوصیات گیاه‌شناسی عَنَاب امروزی تطبیق داده و نام علمی دقیق آن را مشخص کنیم.

سیری در منابع گذشته:

عَنَاب میوه درختی است که ارتفاع آن نزدیک به درخت کنار و زیتون و برگ آن اندک ضخیم‌تر و طولانی‌تر از برگ کنار و دراز و منقسم و یک روی آن کرک‌دار و گلش زرد رنگ است. پوست درخت آن سرخ رنگ و چوب آن نیز سرخ رنگ

عَنَاب که با همین نام نیز در منابع طب سنتی ذکر شده است یکی از گیاهان تیره عَنَاب (Rhamnaceae) است که در نیمه شمالی ایران به‌طور طبیعی رشد می‌کند و به دلیل استفاده از میوه‌های آن در نقاط مختلف نیز کشت می‌شود. عَنَاب درختچه‌ای با شاخه‌های فراهم و دو نوع خار کشیده و بلند و یا کوتاه خمیده و ریزان است. برگ‌های آن سبز براق و فاقد کرک یا با کرک‌های بسیار پراکنده و در امتداد رگبرگ‌ها در سطح زیرین است. این برگ‌ها به صورت متناوب نسبت به هم قرار گرفته، مستطیلی یا تخم مرغی، نوک باریک یا با نوک چاله‌دار است. بر روی سطح برگ‌ها سه رگبرگ اصلی به صورت برجسته دیده می‌شوند و در حاشیه دندان‌دار می‌باشند.

و نیم رنگ و خالدار است. عناب عمدتاً در کوه‌ها می‌روید. بهترین نوع میوه بالیده به کمال رسیده سرخ شده، پر گوشت جرجانی و یا خطایی و نیپالی آنست که شیرین بوده و عفوصت آن کم باشد (۱، ۲).

عناب از آسیای شرقی، جنوبی و خاورمیانه به سمت غرب گسترش پیدا کرده است. به نحوی که از ۴۰۰۰ سال قبل در چین کشت می‌شده است و لذا به خرما‌ی چینی نیز معروف است (۳). در متون طب شرقی به‌ویژه طب چین و کره مربوط به ۲۵۰۰ سال قبل، میوه، دانه و پوست آن در درمان بی‌خوابی، کاهش اشتها و سوء هاضمه، آرتريت و نیز به عنوان ضد بارداری مصرف می‌کرده‌اند (۴، ۵، ۶).

طبیعت عناب در منابع مختلف متفاوت ذکر شده است. هروی آن را سرد و تر دانسته است (۷). رازی و ابن بيطار عناب را در درجه اول گرم و تر ذکر کرده‌اند (۸، ۹). ابن نفیس اعتقاد به گرمی و خشکی آن داشته است (۲). ابن سینا سرد در درجه اول و معتدل در حرارت و برودت و کمی مایل به رطوبت دانسته است (۱۰).

عناب ملین احشاء و مسهل اخلاط رقیقه و منضج^۱ اخلاط غلیظه است (۱۱). موجب برانگیختن بلغم می‌شود (۷). صاف‌کننده خون و موکد خون صالح است (۱۰). مسکن التهاب و تشنگی است و گرمی و تیزی خون را فرو می‌نشاند و جهت اطفال و تبرید و تسکین هیجان خون نافع است (۷، ۹، ۱۰). برای سرفه‌ای که ناشی از گرمی باشد مفید است. سینه را نرم می‌کند و جهت درد سینه و تنگی نفس نافع است (۷، ۹). ملین طبع است (۷). جهت درد کلیه و مثانه (۱۰) و امراض مقعد و گرمی و درد جگر و فساد مزاج آن (۱، ۱۱) مفید است. عناب ساییده با دانه، رافع زخم‌های روده‌ای است (۱۱). طلای^۲ ساییده آن به تنهایی و با هسته، مسکن التهاب و ورم حار چشم است (۱). نیم رس آن حابس بطن است (۹). میوه عناب مضر معده بارد رطب و دیر هضم بوده (۱، ۷) و زیاده روی در مصرف آن نفاخ است (۹). مصلح آن شکر و مویز است (۱۱). مقلل منی و مصلح آن غسل و ادویه باهی^۳ و در مبرودین گلاب و شکر است (۹، ۱۱). بدل عناب، سپستان است (۱۱).

برگ عناب باعث بی‌حسی زبان و کاهش حس چشایی می‌شود. آب برگ آن رافع خارش بدن است. پودر برگ خشک آن در رفع آکله^۴ و قروح خبیثه^۵ مجرب است (۹).

پوست درخت عناب جهت قروح خبیثه بی‌عَدیل و برطرف کننده خارش و جرب است و طلای آن جابر شکستگی اعضاء و بیرون رفتن و حرکت کردن استخوان است (۹، ۱۱).

در منابع معتبر سنتی، نام‌های متفاوتی برای عناب ذکر شده که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

فارسی: اوناف دار، سیلانک، سیلانه، سنجد گرگان

ترکی: عناب آغاجی (۱۲)

اندلسی: زُفیزَف (۹)

عناب

نام علمی: *Ziziphus jujuba* Miller

نام تیره: عناب (Rhamnaceae)

نام انگلیسی: Jujube

مشخصات گیاه‌شناسی: درختچه ایستاده به ارتفاع تا حدود ۱۰ متر، شاخه‌ها فراهم؛ خارها دو نوع کشیده و بلند و کوتاه و خمیده، ریزان. برگ‌ها به طول تا ۵ و عرض تا ۳ سانتی‌متر، سبز براق، فاقد کرک یا با کرک‌های بسیار پراکنده در امتداد رگبرگ‌ها در سطح زیرین، متناوب، مستطیلی یا تخم مرغی، نوک باریک یا نوک چاله‌دار، با ۳ رگبرگ اصلی برجسته، در حاشیه دندانه‌دار؛ دمبرگ‌ها به طول تا ۳/۵ میلی‌متر، کرک‌دار، گل آذین خوشه‌ای کوچک محوری یا منفرد. گل‌ها به رنگ سبز متمایل به زرد، فاقد کرک، به قطر ۳ تا ۴ میلی‌متر. کاسبرگ‌ها به طول ۲ تا ۳ میلی‌متر، مثلثی، سبز رنگ. گلبرگ‌ها به طول ۲ میلی‌متر، قاشقی، پرچم‌ها ۵ تایی. دیسک پهن با ۵ تا ۱۰ لوب در وسط حلقه پرچم‌ها. خامه دوشاخه، کوتاه. میوه شفت، کروی تا کمی کشیده و بیضوی، قرمز یا قهوه‌ای تیره. فصل گلدهی اواسط بهار تا اواسط تابستان و زمان رسیدن میوه تابستان تا اوایل پاییز است. عنصری خزری و کاشته شده در سایر مناطق رویشی.

نتیجه گیری:

عَناب با همین مدخل در منابع مکتوب طب سنتی آمده است. در این تحقیق با مطابقت دادن شرح ماهیت و افعال ذکر شده در منابع طب سنتی با شرح گیاهشناسی و موارد مصرف جدید اینطور نتیجه گیری شد که عَناب میوه گیاه *Ziziphus jujuba* Miller است.

پی نوشتها:

۱. مُنْضِج: پزنده، دوائی که خلط و ماده را بپزد و مهیای دفع کند.
۲. طَلَا: دوائی رقیق که بر عضو بمالند.
۳. باهیة: منسوب به باه، شهوات انگیز
۴. آکله: هر قرحه که گوشت را خورد، خوره
۵. قروح خبیثه: زخم های بد و دیرعلاج
۶. Stress Ulcer

پراکنش در جهان و ایران: این گیاه در شمال ایران رویش دارد. همچنین در قفقاز، آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان و هند رشد می کند. (۱۳)

موارد مصرف امروزی: مصرف خوراکی میوه عَناب به عنوان مغذی و مقوی بدن مطرح است. همچنین کاربرد آن به عنوان پیشگیری از اختلالات کبدی و زخم های ناشی از تنش ۶ مورد نظر است (۳). علاوه بر این اثری نظیر لینت مزاج، آرام بخش، ضد گرفتگی عروق، ضد آسم، ضد جهش و کاهنده آثار سوء آنها بر روی بدن را برای میوه عَناب بیان کرده اند (۴). گرچه تا کنون هیچ عارضه جانبی از مصرف مقادیر درمانی میوه عَناب گزارش نشده، لیکن کاربردهای مطرح شده آن با شواهد معتبر بالینی مورد تأیید قرار نگرفته اند (۳).

References:

۱. عقيلي خراسانی، محمدحسین. مخزن الادویه. تحقیق و تصحیح: محمدرضا شمس اردکانی، روجا رحیمی، فاطمه فرجامند. تهران: اندیشه ظهور با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۹، صص ۵۵۸-۵۵۹.
۲. ابن النفیس قرشی، علی بن ابی الحزم. الشامل فی الصنایع الطبیه. ج. بیستم. مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب سنتی و مکمل. تهران. صص. ۲۰۷-۲۱۶.
3. William H. Outlaw Jr., Shuqiu Zhang, Kimberly A. Riddle, Arthur K. Womble, Loran C. Anderson, William M. Outlaw, Nedra N. Outlaw, Elizabeth C. Outlaw, and Anne B. Thistle. The jujube (*Ziziphus jujuba* Mill.), a multipurpose plant. *Economic Botany* 56(2):198-200. 2002.
4. Vahedi F, Fathi Najafi M, Bozari K. Evaluation of inhibitory effect and apoptosis induction of *Zyzyphus jujube* on tumor cell lines, an in vitro preliminary study. *Cytotechnology*. 2008; 56(2):105-111
5. Jiang JG, Huang XJ, Chen J, Lin QS. Comparison of the sedative and hypnotic effects of flavonoids, saponins, and polysaccharides extracted from Semen *Ziziphus jujube*. *Nat Prod Res*. 2007; 21(4):310-320.
6. Gupta M, Mazumder UK, Vamsi ML, Sivakumar T, Kandar CC. Anti-steroidogenic activity of the two Indian medicinal plants in mice. *J Ethnopharmacol*. 2004; 90(1):21-25.
۷. هروی، موفق الدین ابومنصور. الابنیه عن الحقایق الادویه، تحقیق و تصحیح: احمد بهمنیار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۶، صص. ۲۲۶.
۸. رازی، محمد بن زکریا. الحاوی فی الطب. جلد بیست و یکم، تهران: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴، صص. ۱۲۰.
۹. ابن بیطار، عبدا... بن احمد. الجامع لمفردات الادویه و الاغذیه، بیروت: دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۲ ه.ق، صص. ۱۹۱.
۱۰. ابن سینا، حسین بن عبد... قانون فی الطب، بیروت: دار احیا التراث العربی، ۱۴۲۶ ه.ق، جلد دوم: صص. ۷۲.
۱۱. حکیم مومن، سید محمد مومن بن محمد زمان. تحفه المونین، تحقیق و تصحیح: مؤسسه احیای طب طبیعی، قم: نور وحی، ۱۳۹۰، صص. ۶۰۶.
۱۲. میرحیدر، حسین. معارف گیاهی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. ۱۳۸۵. جلد ششم: صص. ۴۰۸.
۱۳. قهرمان. احمد. فلور رنگی ایران. تهران: انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی، ۱۳۵۷. جلد اول شماره ۱۶۴.